四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷九十八

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官編修臣嚴福

謄録監生臣蔣錦城

普濟方卷九十八　明　周王朱橚　撰

諸風門

中風百節疼痛論

夫中風百節疼痛者由體虚受風風邪中關節故令百節筋脉拘急疼痛寒熱更作不可屈伸此皆真氣怯弱不勝風邪真邪相搏所以痛也

方

麝香丸（出聖劑總録）治中風手足拘攣痰涎不利精神昏昧百節疼痛

麝香 牛黄（並研） 蔓荆實（去皮） 木香 人參 赤茯苓 黑芎藭 獨活（去蘆頭） 麻黄（去根節） 海蛤 牛膝（酒浸） 羌活（去蘆頭） 附子（炮去皮臍） 乾蝎（炒去土） 防風（去叉） 白殭蠶（炒） 海桐皮（剉） 龍齒 敗龜（酒浸炙） 萆薢 赤箭（酒炙） 酸棗仁（炒） 甘菊花 天南星 桂（去粗皮） 乾薑（炮） 虎骨（酒浸炙各一兩） 烏蛇（酒浸去皮骨炙四兩）

右為末再同研勻鍊蜜和丸如彈子大每服一丸薄荷酒下服之

仙茅散出危氏方 治臂膊手足頭目筋脉虛掣一切風證疼痛不可忍立有效

仙茅無則好蒼术代之一兩 陳皮 枳實炮 厚朴製 官桂 秦艽各一錢 當歸 白茯苓 白芍藥 白芷 川芎 半夏餅各一錢半 麻黄不去節二錢半 沒藥 甘草 川烏炮各半兩 白姜 乳香各二錢 獨活二錢 全蝎七枚 麝香半錢

右除桂芷麝乳没餘並炒轉色却入不炒藥同為末每服三錢炒大黒豆同木瓜葉浸酒旋温調服不拘時候

羌活湯出聖劑總録　治中風百節疼痛頭目昏眩及傷寒頭疼壯熱肢節疼痛肩背拘急

羌活去蘆頭　官桂去粗皮　防風去叉各半兩　天麻　甘菊花　旋覆花　白附子炮　甘草炙　欒荆去欒信謂之頑荆也　天南星水浸七日切作片子焙乾　麻黄去根節　烏頭鹽水浸一日切作片焙乾各四

兩葳靈仙六兩防子炮去皮臍蒼朮米泔浸一宿切炒各半斤陳橘皮湯浸去白焙半斤牽牛子擣取粉三兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞入薄荷七葉生薑三片同煎至七分去滓溫服

羌活散出聖濟總錄 治中風百節疼痛寒熱更作不可俯仰

方見中風類七味羌活散

搜風趁痛散出聖濟總錄 治中風身體筋脉骨節疼痛

白附子炮附子炮製去皮臍赤小豆天南星炮去臍狼

毒　海桐皮剉　自然銅醋煅碎　地龍炒去土各等分

右為散每服半錢至一錢匕葱酒調下豆淋酒亦得空心服

白花蛇散出聖劑總録　治中風肢節疼痛言語蹇澁

白花蛇酒浸炙去皮骨二兩　何首烏去黑皮切　牛膝三味用酒浸半日焙乾

蔓荆實去黑皮各四兩　葳靈仙去土　荆芥穗　旋覆花各二兩

右為末每服一錢以温酒調空心臨卧時服

三黄湯一名麻黄湯　治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心

躁惡寒經數日不欲飲食加減方見中風四肢拘攣不得伸屈類

芎桂散出三因方 治中風四肢疼痛及兩足俱軟行履不便

川烏頭三兩水浸切作筭子條更以米泔浸一宿不洗日乾麩炒微赤為度乾了秤一川

芎一兩半 桂心一兩 甘草炙 乾薑炮各一分

右為末每二錢溫鹽酒調下日三服

神朮湯出聖劑總録 治外傷風邪百節痠疼頭疼身重遍體發熱氣麤眼痛

蒼术剉碎四兩　甘草　麻黄去根節各三兩　猪牙皂莢四挺去皮

右並生用粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時温服厚被蓋出汗入葱白三寸杏仁二枚碎豉七粒同煎服尤佳

治諸風痛攻四肢百節

黒豆炒去皮半升　葳靈仙二兩　桑根白皮剉一兩

右用醇酒一升半煎至八合去滓頓服

又方出聖濟總録

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黄研半兩 虎骨酒塗炙黄取半兩為細末

右用醇酒一升熱調頓服

芍藥方一名虎骨酒出千金翼方 治風毒骨髓疼痛

芍藥二分 虎骨一兩炙

右為細末夾絹袋盛酒三升漬五日每服二合日三服

白頭翁酒出聖劑總録 治諸風痛攻四肢百節

用白頭翁草一握爛研以醇酒投之頓服

又方出聖劑總録 用生惡實根磨酒服痛即止住

治骨髓風毒疼痛不可運動者方見本門風毒類

治中風筋攣附骨疼痛

用羚羊角生磨和水塗腫上及惡瘡良

虎骨散出十便方 治筋骨疼痛袪風邪通血脉方見偏枯類

治大風攻疰四肢筋骨疼痛遍身生瘡皮膚破爛大便秘黄小便熱赤宜服此方

牡丹皮去心 麻黄去根 白花蛇酒浸如前法炙 黄芩 芍藥

山梔 牛蒡根子 羌活 荆芥穗 細辛去葉 虎

杖　乾蝎　大黄　秦艽各一分　連翹半兩

右為細末每服三錢水一盞煎一沸急瀉出食後去滓熱服

孫盈仲常患手足十指疼痛麻木其祖善醫云有風而非虚以此方治之而愈

附子　木香

右二味剉為粗末用薑如常法煎木香隨氣虚實加減如治從弱去附子用烏頭

治中風氣壅言語蹇澁精神昏亂筋脉拘急犀角獨活湯方高士英職方傳云屢有效

犀角屑 獨活 茯神 人參 石菖蒲 川芎 甘草（炙一分） 漢防已 防風（已上各一兩） 黑參（一分） 酸棗仁（半兩炒） 桂（一分）

右十二味為麤末每服四錢匕水一盞半生薑三片薄荷七葉同煎至七分去柤不計時候服

再甦丹（出華陀經中藏經方） 治骨節疼痛言語不正行步艱難

手足戰掉搐搜

川烏頭二兩 草烏頭一兩 五靈脂四兩

右為末滴水為丸如鷄頭子每服一丸研碎入酒一盞生薑三片地黃三條乳香少許同煎至七分臨卧通口服吃了須摩擦患處令熱徹以助藥力如合時入乳香一錢即煎時更不須入

主風在骨節間及血痰出本草

以虎杖煮汁作酒服之

治筋骨風急痛出本草

以虎骨和通草煮汁空腹服半升被蓋卧之少時即汗出切忌熱食損齒一方治骨風毒以虎骨煮湯浴之良

治中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜出本草

取烏驢皮一領燖洗如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和再煮空心服之

治筋骨急强中風出本草

以羚羊角加五味子炒之投酒中經宿飲之

治諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者出本草

入温湯浴之浴乾當大虛憊可隨病與藥及飲食補養

治中風骨節攣急五勞七傷及皮膚風

用五加皮葉作蔬菜食效

風腰脚疼痛附論

夫腰者腎之府也腎主腰脚其氣不足故腰脚濕痺有是風濕冷三氣相攻而成也氣勝則通行流轉不為留滯風濕冷氣勝則注於腰脚而與正氣交爭經脉凝滞不能榮養於腰脚故屈伸步履皆痛是為濕痺風濕痺亦如蟲行覺則以手捫之復不痛春多入於筋肉間夏入人氣脉中秋入人皮膚内撥之濕痒生瘡冬多中人血脉腠理則為諸風矣本由外風邪入於經絡氣命也

方

乾蝎丸　治元臟風氣攻疰腰膝疼痛及一切風氣

乾蝎（去土微炒）　天麻　羌活（去蘆頭）　附子（炮去皮臍）　檳榔（剉）　沉香（剉）　木香　牛膝（酒浸切焙）　狼毒（切作塊先用醋煮三五沸焙乾剉）　白附子（微炒）　桂（去粗皮）　當歸（切焙）　枳殼（去穰麩炒）　防風（去叉）　巴戟天（去心）　昆布（洗鹹汁炒）　牽牛子（炒半熟）　人參　高良薑　蘿蔔子（微炒）　蒺藜子（炒去角）　肉荳蔻（去殼）　沒藥　白朮　防己（剉焙）　硇砂（醋化盡去夾石煉霜各一兩）　獨活（去蘆頭一兩）　阿魏（一分）

右先將硇砂沒藥阿魏三味用好酒一升熬成膏餘

藥同搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大每服五更後空心薄荷酒下二十丸向曉利一行即差

虎骨散 治風腰脚疼痛下注脚膝行步不得或腫痒或在兩膝疼腫痛久療不差漸至足脛細小少力

虎脛骨酥炙二兩 天麻 木香 羌活去蘆頭 芎藭 黃芪剉 蒺藜子炒去角 青橘皮去白切 大腹皮 桂去粗皮 檳榔剉 沉香剉 白茯苓去黑皮 桃仁去皮尖雙仁麩炒 山芋 乾葛剉 海桐皮剉 五味子 敗龜醋浸炙 白鮮皮

各一兩 肉蓯蓉 酒浸切焙 附子 炮去皮臍各一兩半 甘草 炙半兩

右為散每服二錢匕空心臨卧或温酒鹽湯任下

虎骨浸酒方 治風氣攻注腰脚骨髓疼痛

虎脛骨 半斤酥塗炙微黃 熟地黃 二兩 石斛 去根 獨活 防風 去蘆頭 牛膝 去苗 丹參 桂心 當歸 萆薢 芎藭 酸棗仁 微炒 山茱萸 仙靈脾 五加皮 附子 炮製去皮臍 骨碎補 去毛 川椒 去目及閉口者微炒出汗 白蒺藜 微炒去刺 已上各一兩 烏蛇 一條重半斤者酒浸去皮骨酥塗炙微黃色

右細剉以生絹袋盛以好酒三斗於磁瓮中浸之密封經七日後每日空心日午近晚各温服飲一盞常令醺醺以差為度忌生冷油膩猪鷄粘滑物

虎骨丸 治肝腎藏風毒流注腰脚疼痛痺冷及筋骨拘急行履不得

虎脛骨一兩酥塗炙令黄 沉香 乾蝎微炒 天南星炮製 芎藭 白附子炮製 赤芍藥 硫黄細研 川烏頭炮去皮臍 白殭蠶微炒已上各半兩 白花蛇二兩酒浸去皮骨炙令微黄 天麻 防風

羌活（去蘆頭） 桂心 羚羊角屑（已上各三分） 海桐皮 麻黄（去根節） 牛膝（去苗已上各一兩）

右為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下二十丸

虎骨散 治風腰脚冷痺疼痛行履不得

虎脛骨（一兩酥塗炙令黄） 敗龜（酥塗炙令黄） 附子（炮製去皮臍各一兩） 芎藭 天麻 白附子（炮製各一兩） 防風（去蘆頭一兩） 牛膝（去苗一兩） 羌活 乾薑（炮製剉） 萆薢（剉各半兩） 烏蛇（一兩酒浸去皮骨炙） 海

桐皮 桂心 骨碎補去毛 熟地黄 當歸微炒三分 麝香三分研

右為散入研了藥令勻每服食前以温酒調下二錢忌生冷猪鷄等物

白花蛇浸酒方 治風骨髓及腰脚疼痛行步稍難兼風毒攻注皮膚痒痛不知

白花蛇一條重半斤去皮骨炙黄 虎脛骨一對酥塗炙黄 當歸 芎藭各一兩半 附子炮製去皮臍 桂心 熟地黄 防風去蘆頭 山

茱萸 萆薢 石斛去根 牛膝去苗 細辛去苗土 天麻

黃芪已上各二兩 獨活三兩 枳殼二兩麸炒微黃色去穰 肉蓯蓉二兩半酒浸一宿刮去粗皮用

右細剉以生絹袋盛以好酒三斗於瓷瓮子內密封浸七日後隨性煖飲常令醺醺勿令大醉其酒旋添酒味少薄即換藥忌生冷粘滑動風物

防風湯 治風濕脚脉腫痛

防風去叉 麻黃去根節煎去沫焙 石帝去毛 絡石 桑白皮

大腹皮　芎藭　生地黄各一兩半　附子炮製去皮臍二兩　白术　桂心去粗皮　羌活去蘆頭　牡丹皮　射干各一兩　草薢去皮四枚　桃仁二十枚去皮尖雙仁炒

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑五片同煎取八分去滓温服

茄子根浸酒方　治風毒攻注脚腰骨髓疼痛皮膚冷痺筋脉拘急屈伸不得

茄子根二斤洗令淨晒乾　蒼耳子一升微炒搗碎　鼠粘子一升微炒搗

牛膝二斤去苗 牛旁根一斤 防風三兩去蘆頭 萆薢 桂心

羌活 秦艽去苗 附子一兩炮去皮臍 晚蠶沙半升 大麻子一升

虎脛骨酥塗炙黄 枸杞子一升半蒸半炒

右細剉用生絹袋盛以無灰酒五斗浸之封閉勿令透氣經十日後開取開時不得面向瓶口每日空腹午時近夜各温飲一盞常令醺醺為妙忌毒滑魚肉動風物

續斷湯出聖劑總錄 治腎氣虛弱卧冷濕地風邪乘之

流入腰脚冷痺疼痛

續斷 杜仲去粗皮剉炒 桂心去粗皮 防風去叉 牛膝酒浸切焙

細辛去苗葉 白茯苓去黑皮 人參 當歸切焙各二兩 白芍

藥二兩 獨活去蘆頭 芎藭 秦艽去苗土 生地黄焙 甘草

炙各三兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去粗温

服宜服蒴藋葉火燎候安牀上及熱卧上冷即易之

冬月取根擣用一方生薑三片棗一枚同煎空心服

之

虎骨湯 出聖濟總録 治風腰脚疼痛筋脉拘急

虎頭骨牙齒 炙三兩 天雄 炮去皮臍 當歸 切焙各二兩 菝葜

代赭 醋煅碎 黄芪 桂心 去粗皮 羌活 去蘆頭各一兩 赤芍藥

防風 去叉 芎藭 桔梗 絡石 桑耳 山茱萸

各一兩半

右剉如麻豆每服五錢匕水酒共一盞半入生薑一

棗子大切煎取八分去柤温服不拘時

虎脛骨湯出聖劑總録　治風毒脚膝痠痛履地不得嘔逆吐食憎寒沉重宜服之

虎脛骨酥塗炙　當歸焙　附子炮製去皮臍　桔梗炒各一兩半　赤石脂　酸棗仁炒各一兩　白芷　桂心去粗皮　白术　地榆　木香　黃連去須各半兩　厚朴去粗皮生薑汁炙半兩　肉豆蔻一枚去殻　黃芩去黑心半兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去粗温服

牛膝丸出聖惠方 治風腰脚疼痛冷痺筋骨無力

牛膝去苗 草薢剉 杜仲去粗皮炙令黄色剉 附子炮製去皮臍 乳香 安息香 石斛去根剉已上各二兩 酸棗仁微炒 防風去蘆頭 丹參 芎藭 當歸剉微炒 桂心 羌活 白茯苓已上各三分

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空腹以酒下二十丸晚食前再服忌生冷油膩猪魚鷄犬肉

杜仲浸酒方 出聖惠方 治風冷腰脚疼痛屈伸不得

杜仲 去粗皮炙黄 蛇床子 當歸 芎藭 乾薑 炮製 秦艽 去苗 附子 炮去皮臍 石斛 去根 桂心 細辛 茵芋 天雄 炮去皮臍 川椒 去目及閉口者微炒出汗 防風 去蘆頭 獨活 已上各二兩

右細剉以生絹袋盛用好酒三斗於瓶中浸之七日後開每温飲一小盞常令醺醺不得大醉酒浸其藥滓曬乾擣細羅為散每服以温酒調下二錢

酸棗仁浸酒方 出聖惠方 治風氣暖臟腑利脚膝止疼痛

酸棗仁微炒　生地黄　虎脛骨酥塗炙黄各三兩　羌活　牛膝去苗　山茱萸　桂心　天雄炮製去皮臍　仙靈脾　萆薢　芎藭　天麻　肉蓯蓉去粗皮已上各二兩　甘菊花　桑寄生各一兩半

右剉細末以生絹袋盛好酒三斗於淨瓷瓶中浸密封瓶口五日後開取每日三五度温飲一盞常令醺醺瓶中酒少旋更添之候藥無味即更修合以差為度忌毒滑物

羌活湯出聖濟總録 治下焦風虛腰脚𤸷痺不仁骨髓痠疼不能久立漸覺消瘦

羌活去蘆頭 防風去叉 黄芪剉 五加皮剉各一兩半 丹參剉

酸棗仁炒一合 桂心去粗皮 芍藥 麻黄去根節煎去沫各一兩一分 檳榔四顆剉 當歸切焙 玄參 木通剉各二兩 牛膝酒浸切焙一兩半

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓空腹食前溫服良久以熱生薑稀米粥投衣覆微出汗

慎外風

羌活散　治下焦風虛腰脚疼痛冷痺不任行履

羌活　牛膝去苗　附子炮去皮臍　酸棗仁微炒　虎脛骨酥塗炙黄

萆薢剉　當歸微炒剉　松節剉已上各一兩　防風去蘆頭　五加皮

木香　威靈仙　桂心　丹參已上各三分

右為散每服食前以豆淋酒調下二錢

石斛浸酒方　治風冷氣攻腰脚行立無力

石斛去根　牛膝去苗各五兩　五加皮　羌活　防風去蘆頭

海桐皮　木香　桂心　芎藭　甘菊花　川椒法前各三兩　防子炮製去皮臍　天麻各三兩　虎脛骨五兩酥塗炙黄

右細剉以生絹袋盛用好酒三斗以甆瓮子盛密封頭浸經七日後開取每日三度温飲一小盞每取一盞却即添一盞只候藥味稍薄即更换之

菊花浸酒方　治風虛久冷腰脚疼痛食少羸瘦顔色淒瘁行立無力

甘菊花　杜仲去粗皮炙黄　鍾乳粉各四兩　當歸　石斛

黄芪去根 肉蓯蓉刮去皮 桂心 防風去蘆頭 附子炮去皮臍 萆薢 獨活 白茯苓 山茱根已上各二兩

右細剉以生絹袋盛好酒二斗於甆瓶中浸密封春夏七日秋冬二七日後開取每日三四度温飲一盞

浸酒方 治諸頭目腰脚筋骨風益血添氣力

虎脛骨八兩炙黄搥碎 丹參 天麻 牛膝各一兩 杜仲 芎藭 羚羊角各六分 烏頭二升炒令得所 蒺蔾 人參 桂各一兩 薏苡仁八分 南椒半兩擇去閉者

右細剉吹去末生絹袋寛盛沉於三斗酒中浸令没密封經七日開空腹量性飲恒令微有酒氣取一盞添一盞藥味薄則换

麻黄湯 治風毒攻腰脚骨節疼痛

麻黄去根節沫焙 細辛去苗葉各半兩 獨活去蘆頭 丹參剉 牛膝去苗酒浸切焙 萆薢 黄芪剉 桂心去粗皮各三分 防風去叉 犀角鎊 羚羊角鎊各一兩 磁石火煆醋淬五七遍一兩半

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓空

心早晚食前溫服

內灸羌活木瓜丸　治下經風冷氣攻注腰膝疼痛腫滿沉重少力行步艱難

羌活去蘆頭　木瓜一枚　天雄炮製去皮臍　桂心去粗皮　懐香子炒　牛膝去苗酒浸焙　木香　天麻　陳橘皮湯浸去白各一兩　硇砂別研一兩半　没藥研一兩　艾葉用葉別搗末四兩

右為末將木瓜剜去穰留蓋將艾末硇砂與熟蜜拌和在木瓜內蓋了以竹簽簽定於銀石器內盛就飯

甑内炊取爛與前藥末一處拌和更杵三五百可丸即丸如桐子大每服三十丸微嚼破温酒下鹽湯亦得如難丸更少許酒煮麵糊同丸

側子散 治風腰脚疼痛筋脉拘攣

側子炮製去皮臍 赤箭 酸棗仁微炒 海桐皮剉各一兩 芎藭 漏蘆去蘆頭 桂心去粗皮 五加皮剉 仙靈脾 牛膝酒浸切焙 木香各三分 枳殼去穰麩炒半兩

右為散每服二錢匕温酒調下不計時候此藥由治

目赤痛累用極驗

萆薢散　治腰脚疼痛及冷痺不任行履

萆薢剉二兩　防風去蘆頭　羌活　附子炮去皮臍　薏苡仁

石斛去根剉　牛膝去苗　赤芍藥　杜仲去粗皮炙黃各一兩　桂心

當歸　酸棗仁微炒各三分

右為散每服四錢以水酒各半中盞煎至六分去柤

食前温服忌生冷油膩毒魚滑物

萆薢浸酒方　治腰脚風毒攻注疼痛

萆薢 牛膝去苗 石斛去根 乾地黄各三兩 防風去蘆頭 獨活 川芎 山茱萸 當歸 酸棗仁微炒已上 桂心二兩 大麻仁五兩

右細剉以生絹袋盛好酒二斗於瓷瓶中密封七日後開取每日三五度温飲一盞常令醺醺勿大醉

仙靈脾浸酒方出聖惠方 治風腰膝疼痛

仙靈脾三兩 桂心 防風去蘆頭 虎脛骨酥炙微黄 羌活 萆薢 芎藭 生地黄 海桐皮 牛膝去苗 骨碎

補去毛附子法前已上各二兩

右細剉用生絹袋盛以清酒二斗於瓷瓶中浸密封經五日後取隨性飲之酒少旋添候藥味薄即再合以差為度忌生冷毒滑魚物

五加皮浸酒方出聖惠方 治風毒氣攻腰脚連骨髓日夜疼痛


五加皮 熟地黄各三兩 枳殼麩炒微黄去穰 防風去蘆頭 乾薑炮各一兩 獨活 地骨皮 牛膝 烏喙炮去皮臍 石南

葉各二兩 丹參一兩半 虎脛骨五兩酥塗炙黄

右細剉用生絹袋盛用清酒二斗於瓷瓶中浸密封七日後開每日三五度温飲一小盞常令醺醺以差良

牛膝湯出聖劑總録 治風腰脚疼痛不能運動足心俱痛

牛膝酒浸焙 乾木瓜焙 牡丹去心 芎藭 萆薢各一兩半 桂去粗皮 羌活 羚羊角一兩 黄芪各半兩 天雄炮製去皮臍 桑根白皮各二兩


右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎

至八分去滓空心温服

當歸湯出聖濟總錄 治風冷留著腰膝疼痛

當歸切焙 桑耳 萆薢 牛膝酒炒 射干各一兩半 芎藭

附子治法同 厚朴去粗皮生薑汁炙各二兩 桂心去粗皮 乾薑炮 陳

皮去白炒各二兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑一棗大煎

至八分去滓服

牛膝浸酒出聖惠方　治風腰脚疼痛及皮膚不仁筋脉拘急

牛膝去苗　菖蒲　酸棗仁微炒　芎藭　石斛去根　仙靈脾

赤箭　虎脛骨酥炙黄　桂心　附子炮去皮臍　萆薢已上各三兩

右細剉以生絹袋盛以清酒二斗於瓷瓶中浸密封七日後開取每服一盞常令醺醺勿醉酒盡更添以藥味薄即換之忌生冷毒物

海桐皮浸酒（出聖惠方） 治風毒流入脚膝行履不得

海桐皮　五加皮　獨活　防風（去蘆）　乾蝎（生用）　杜仲（去粗皮炙黃）　薏苡仁　酸棗仁（微炒）　桂心　側子（炮製去皮臍已上各一兩）　生地黃（三兩）

右剉如麻豆大用生絹袋盛以好酒二斗於磁瓶中浸密封秋夏七日春冬二七日開取每日不拘時候温服一小盞

獨活湯（出聖濟總録） 治風腰脚疼痛足脛瘰痺

獨活去蘆頭一分 黄芪剉半兩 防風去叉 茯神去木 桂去粗皮 白鮮皮 羚羊角各一分 酸棗仁炒五錢 桃仁去皮尖雙仁炒一兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓温服空心日午夜卧各一

一方治中風半身不隨身體筋脉攣急肝心壅滯有五加皮無桃仁

蓯蓉丸一名騙馬丹出聖濟總錄 治風氣攻疰腰膝疼痛

肉蓯蓉酒浸焙 狗脊去毛 萆薢 葫蘆巴炒 防風去叉 白豆蔻去皮 烏頭炮去皮臍 牛膝去苗酒浸切焙各等分

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸茶酒任下

木香丸 出聖濟總録 治風毒下注脚腰連膝虚腫疼痛

木香 没藥 別研 烏藥 剉 天南星 炮 白附子 炮 附子 炮去皮臍 烏頭 炮去皮臍 蒺藜子 炒去角 各一兩

右為末用木瓜一枚重七八兩者開頭取皮穰入硇砂半兩蓋之竹簽簽定蒸上甑爛熟和前末藥同杵得所旬為丸如梧桐子大每服三十丸空心冷酒下

良久煎荆芥茶投之

牛膝散出聖濟總録 治風冷腰脚疼痛行步不能

牛膝酒浸焙三兩 巴戟去心 附子炮去皮臍各二兩 桂去粗皮 羌活去蘆頭 五加皮剉 杜仲去粗皮炙 乾薑炮各一兩半

右為末鍊蜜和丸如桐子大每服三十丸食前酒下

桑根白皮湯出聖濟總録 治風腰脚不隨或痛或痒腫硬如石脛中少力及指間生瘡有黄水自出不止

桑白皮剉三分 漏蘆去蘆頭 茯神去木 敗醬 木通剉 芎

藭各三分 羚羊角半兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入生地黄汁半盞更煎令沸空心日午臨卧温服

龍虎丹出聖劑總録 治腰脚風痛

草烏頭剉 風香脂研 五靈脂 木鱉子去殻別研 地龍炒各一兩 乳香别研半兩

右為末井花水拌和擣千百下丸如鷄頭實大以丹砂為衣每服一丸臨卧以冷酒磨下乳香酒亦得以

先嚼胡桃仁半枚服之藥成陰乾勿令見火

檳榔丸出聖劑總録　治風氣攻注脚腰疼痛手足沉重

檳榔一兩半　乾薑炮　木香　皂莢去皮酥炙各一兩　牽牛子三兩搗取一兩　青橘皮湯浸去白焙二兩

右為末鍊蜜如梧桐子大每服二十丸冷葱茶下食前服微利為效痛減即少服

治風氣攻刺手脚腰背痛楚無藥可療出聖劑總録

附子炮製去皮臍半兩　吴茱萸湯洗焙乾炒　木香一兩　桂去粗皮　蛇

牀子各一兩　馬藺花三兩

右為末每用半匙頭入白麪少許生薑自然汁調稀稠得所為膏攤紙上貼患處更用油單紙隔以綿衣裹定

應痛丸出永類鈐方　治寒濕風損手脚疼痛

生蒼朮一斤　舶上茴香十二兩微炒　破故紙一斤半生半炒　骨碎補一名胡孫薑一斤樟柱石上生亦可旋取去土毛　生草烏一斤剉如川子大　山甲六兩去末桑灰炒脹為度除灰亦可

右除草烏一斤用生葱一斤連皮生老薑一片擂爛將草烏一處淹兩宿焙乾連前藥作一處曬乾或焙乾研為細末酒煮麪糊為丸如梧子大每服五十丸或酒湯下病在上食後停片時服病在下空心服服後忌一時熱食

仙靈脾散出聖惠方 治風腰脚疼痛冷痺及四肢緩弱

仙靈脾一兩 附子炮製去皮臍 當歸剉微炒 萆薢剉 杜仲去粗皮炙黄 木香各一兩

右為散每服食前以温酒調下二錢

浸酒方　治風腰脚疼痛

杜仲八兩去粗皮炙令黄色　石南　羌活　附子炮製去皮臍　牛膝去苗各三兩　防風二兩去蘆頭

右細剉以生絹袋盛用好酒三斗於瓷瓶中浸七日後開取每日三四度飲一盞

狗脊丸一名五生丸出聖劑總録　治風腰脚疼痛

狗脊去毛　防風去叉　萆薢　烏頭炮去皮臍一兩　蓬莪茂煨半兩

右為細末水煮麪糊和丸每服三十丸如梧桐子大空心温酒下一以醋和為丸鹽湯下

治風毒攻脚膝疼痛不能屈伸及歷節風等方出聖惠方

牛膝去苗 虎脛骨酥塗炙黄 羚羊角屑 松節 枳殼麩炒微黄去穰各三兩

右細剉以生絹袋盛用好酒二斗於瓷瓶中浸密封春夏七日秋冬二七日後開取每日三四度温飲一盞其酒旋添藥味稍薄即換之

地龍散 出聖濟總録

治風攻腰脚疼及痛痺

地龍 白頸者干瓦上炒五兩 附子 炮製去皮臍二兩 蒺藜子 炒去角 赤小豆 各二兩一半炒

右為末每服二錢匕生薑酒調下空心晚食前服

三神散 出聖濟總録

治風腰脚疼痛不得履地及㧱折傷腫瘀血攻痛

黒豆 二兩連皮炒 當歸 酒浸焙 熟地黄 焙各一兩

右為細末每服二錢以温酒調下食前服

牛膝散出聖濟總錄　治冷痺下焦風冷脚膝疼痛頑痺無力

牛膝酒浸焙　山茱萸湯洗焙乾炒各一兩　桂心去粗皮半兩

右為散每空腹煖酒調二錢匕日二

安息香散　治風腰脚疼痛冷痺及四肢無力

安息香　附子炮去皮臍　虎脛骨酥塗炙黃各二兩

右為散每服食前温酒調下一錢

浸酒方出聖惠方　治風腰脚疼痛冷痺

虎脛骨五兩炮製 側子五兩去皮臍 當歸五兩剉炒

右細剉以生絹袋盛以清酒二斗五升浸之春夏三日秋冬七日每暖飲一小盞服之不耐酒人隨性飲之常令醺

何首烏 治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒

何首烏 牛膝剉各半斤

右以何首烏新掠者去皮土後用銅竹刀薄切片上蒸内炊飯蒸下用甆石鍋忌鐵旁更别燒一鍋常滿

添水候藥甑氣上逐旋以熱水從上淋下勿令滿溢直候首烏絶無氣味然後取下一匙頭白湯亦可此是藥之精英與常不同以好酒一升浸七宿暴乾於木臼内擣末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

皂莢散出聖劑總録　治風腰脚疼痛及腸壅氣滯

用皂莢刺二握東南枝上者燒作灰存性擣羅為散每日空腹用温酒調下一錢匕漸加至三錢匕一方治諸般癜風用猪牙皂莢燒灰酒服並瘥

枳殻散　治風氣壅滯腰脚疼痛方見風口眼喎斜類

豆豉飲　治風毒脚膝攣急骨節痛

用豉心五斗九蒸九晒以酒一斗取浸經宿空心隨

意煖飲

貼脅烏頭散　治風腰脚冷痺疼痛

烏頭三分去皮臍生用

右為散以釅醋調塗於故帛上傅之須臾痛止

治風血補衰老起陽强腰脚除痺變白逐冷氣排風邪

出本草

以南藤煮汁服亦浸酒冬月用之

治諸風腰膝疼痛不可踐地出本草

以鹿蹄四隻燖洗如法熟煮了取肉於豉汁中著五味煮熟空腹飲之

治腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者

用茄根五十斤細切淨洗訖以水五斗煮取濃汁濾去柤更入小鐺器中煎至一升以來即入生粟粉同

圓如梧桐子大每日旦用秫米酒送三十丸近暮再服一月乃瘥男子女人通用皆效

風走注疼痛論

夫風走疼痛之病其痛無常處故也氣血流通筋脉和同則骨肉滑利一有不調風邪乘虛與血氣偕行使榮衛凝澁隨所注處悉為疼痛故謂走注痛也

方

骨碎補丸出聖惠方 治一切風毒走注疼痛

骨碎補 桂心 狗脊 木香 仙靈脾 威靈仙 山茄子 當歸 補骨脂(微炒) 白附子(炮製) 虎脛骨(酥塗炙黃) 自然銅(細研各一兩) 乾蝎(微炒) 天南星(炮製) 沒藥 硃砂(細研) 甘草(炙微赤半兩) 白花蛇肉(酒浸炙黃二兩) 附子(炮去皮臍) 川烏頭(炮去皮臍) 甜瓜子 麻黃(去根節) 芎藭 赤芍藥 羌活 白芷(各三分)

右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二十丸

獨活散出楊子建獲命方　治走注風其病狀兩足疼痛腫起或偏在一足痛行履不得其痛處遊走不定忽項上頭目昏亂或走在右手或走在左手或在一手指頭上或在一脚指頭上只有一點疼痛不可勝忍宜服此一方服了未轉加衆藥作四錢牽牛半夏作三錢共七錢為一服也其遊走痛處一點常赤色甚則遍身有赤色或攻項背或把腰膊或注脚下或攻胸脇腿骨與脛骨俱小惟有膝阿頭瘨腫吃此藥後或在

痛處指甲交或在脚指甲下破出得惡血或在鼻中出得惡血其病方可除根又有白虎風治之亦同此方服之便愈但有人患白虎風必常夢一猫一虎一牛一羊四足畜類等物或夢見小兒婦人女孩將花果食與已其疾與走注風十分相類但甚則下青糞並宜服此方

獨活去蘆頭　阿魏麵少許和薄餅子火上焙乾擣為末各一錢　桂去粗皮　大黄炒　牛膝去苗　羌活去蘆頭　鱉甲醋炙　當歸焙　乾蝎炒　黄

茋　芎藭　赤茯苓_{去黑皮}　木香　麻黄　蔓荊子

半夏_{洗去滑各一分}　吳茱萸_{炒一錢半}　荊芥穗_{二錢}　虎骨_{酥炙四錢}

芫花_{一兩}　狼毒_{搥碎以醋三升同芫花石器内煮乾半兩}　白花蛇_{酒浸去骨仍用}

_{酒又炙乾如此二十次用一兩}　麝香_{少許研}　牽牛子

右將芫花狼毒二味別作一處為末牽牛子半夏二味亦別一處為末其餘衆藥共作一處為末每服芫花狼毒末一錢半夏牽牛子末一錢衆藥末一錢計三錢匕共作一服臨卧葱湯調下

海桐皮煎丸出聖惠方　治風毒走注肢節疼痛不可忍

海桐皮半斤　牛膝去苗半斤

已上二味並細剉以水一斗於大鍋中煎至一升用砂盆內爛研絞取濃汁即却於銀鍋中漸漸入酒三升煎為膏

附子炮去皮臍　川烏頭炮去皮臍各二兩　川大黄剉炒三兩　桃仁湯洗去皮尖雙仁麩炒微黄二兩　虎脛骨酥塗炙黄四兩　五加皮　赤芍藥　肉桂去粗皮　麻黄去根節　當歸　赤箭　地龍微炒　木

香　獨活　沒藥　防風去蘆頭　骨碎補　乳香

麒麟竭　乾蝎　天南星炮各一兩　麝香細研半兩

右為細末入麝香都研令勻入前膏和擣三五百杵丸如梧桐子大每服不計時以溫酒送下二十丸忌食生油毒魚滑物

麝香虎骨散出聖惠方　治男子因氣虛血弱風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨髓之間與氣相搏往來交擊痛無常處遊走不定或日輕夜重少得睡卧筋脉拘急不能

屈伸皆治之

虎脛骨（酥炙）敗龜板（炙各半兩）麒麟竭（研）赤芍藥　没藥（研）自然銅（醋淬研）白附子（炮）蒼耳子（炒）當歸（去苗）防風（去苗）骨碎補（去毛）肉桂（去粗皮）白芷（各一分）牛膝（去苗酒浸）五加皮　川羌活（去蘆）檳榔　川天麻（各二錢半）

右入麝香在內為末每二錢用熱水少許調空心服之或溫酒調下亦可比服此藥之先煎生料五積散三服次日服此藥一方無麝香名虎骨散

狼毒丸（出聖惠方）　治風走注疼痛

狼毒（一分）　天南星　附子（各半兩）

右並生用臨搗合時以淨布裹搥碎用木臼內搗羅為末後以石鍋內煎釅醋成膏和丸如梧桐子大不拘時以冷酒下二丸如不飲酒用冷水下亦得

治風走注疼痛不定隨痛處熨之（出聖惠方）

黑豆（五升）　芫花（一斤）　生薑（半斤）

右都炒旋入醋拌用青布裹熨痛上更番炒以效為

度

虎骨丸（出聖惠方）　治風毒走注疼痛不定

虎脛骨（酥塗炙黄二兩）　牛膝（去苗）　天雄（炮製去皮臍）　天麻　羌活（各一兩）　白附子（炮製）　防風（去蘆）　桂心　酸棗仁（微炒）　天南星

硃砂（細研各三分）　烏蛇（酒浸去皮骨炙黄二兩）　桑螵蛸（微炒）　桃膠（各半兩）　槐膠　當歸　川大黄（炒各一兩）　麝香（研一分）

右為散入研了藥令勻鍊蜜和丸如梧桐子大不計時候以温酒下二十丸

獨聖黑龍丸（出聖惠總録）治一切風氣走注四肢百節痠痛及悶肭肢節等疾

甘松（去土）　零陵香（各半兩）　白殭蠶（生用一兩）　莎草根（炒去毛）　白附子（生）　白芷　麻黄（去根節）　芍藥（各一兩）　半夏（洗去滑焙乾一兩）　墨（二兩）　草烏頭（炮去皮半斤）　天南星　烏頭（炮去皮臍各二兩）　藿香葉（一兩）　山芋（一兩）

右為末以法酒二升米醋一升麵二兩熬作糊丸如彈子大每服半丸用薄荷茶送下酒化亦量虚實服

之

牛膝丸（一名接骨丹出御藥院方）治風氣下注脚膝無力筋骨疼疼或上攻頭目腫痛遍身疼倦壯熱並皆治之

蓯蓉　牛膝（並酒浸）　防風（去蘆）　草薢（切炒）　葳靈仙（去土）　海桐皮（去粗皮）　自然銅（醋浸七次）　狗脊（去毛）　川烏頭（生去皮臍已上各一兩）　没藥（別研）　乳香（別研各半兩）　地龍（去土二兩）　骨碎補（去毛四兩）　木鱉子（去殼別研四兩）

右為細末酒麵糊為丸如桐子大每服五十丸温酒

送下食前服

妙應丸一名青龍妙應丸出危氏方 治諸風攣急遍體疼痛遊走無定百藥不效

川山甲十五片石灰炒去灰 全蝎七個去毒 麝香一別研 地龍去土一兩

草烏生去皮一兩 沒藥 乳香別研各三錢 松脂半兩 蜈蚣七條

生用 五靈脂去砂石三錢 白殭蠶薑汁炒半兩 班猫七個糯米炒去頭目

右為末酒糊丸如菉豆大以青黛為衣每服二十丸不拘時温酒送下忌食熱物

木通丸出聖濟總録 治風走注身體疼痛榮衛凝澁

石斛一兩去根 牛膝去苗酒浸一宿切焙一兩 附子二枚共及一兩者炮製去皮臍

乾薑炮三分 肉豆蔻四枚去皮麪裹煨麪熟爲度 檳榔剉四兩 木香一分 甘菊炒二兩 石硫黄一分 白花蛇酒浸去皮骨焙二兩 枸杞子九蒸九暴炒黄二兩

右爲末以酒煮麪糊和丸如桐子大每服二十丸空心温酒下如服了轉覺腦骨内疼甚者乃藥效婦人當歸酒下作細散每服一錢半匕温酒粥飲任調下

防風天麻散出宣明論 治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴瘖不語内外風熱壅滞觧昏眩出儒門事親

防風 天麻 川芎 香白芷 草烏頭去蘆 白附子 荆芥穗羅淨 當歸焙 甘草各半兩 滑石二兩 羌活半兩

右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度或鍊蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸或半丸細嚼白湯化下或細嚼酒愈妙日三服此藥微有熱性甚能開發風熱鬱結以使氣血宣通而愈

或風多熱少寒凉諸藥不能退者亦宜以開發或三服兩服不中效即却服防風通聖散得熱勢少減復與服之熱勢大甚者及目疾口瘡咽喉腫痛者不宜服之但宜退風熱辛寒之藥也少尤宜服之

如意丸出聖劑總録 治風毒走注筋骨疼痛

草烏頭去皮臍 五靈脂 藁香子炒 青橘皮去白焙 芸薹子 陳皮去白焙 木鱉子去殼 防風去叉生用各一兩 巴豆四十九粒去皮心膜研出油 班猫八十一個去頭足炒 木香一分

右為末用宿炊餅以釅醋煮作糊和丸如豌豆大每服一丸酒下不計時

骨碎補丸出聖劑總録 治風毒走注疼痛

骨碎補去毛兩半 葳靈仙洗焙 草烏頭炮去皮各二兩 天南星炮 地龍去土炒 自然銅醋煅焠 木鱉子去殻 楓香脂各一兩 没藥 乳香研各半兩

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服五丸温酒下空心服之

虎骨散 出聖惠方 治風疼痛走注不可忍

虎脛骨　白芷　當歸　漏蘆　紫笋茶各一兩　桂半兩　硇砂醋塗虎骨上慢火炙黄半兩　芫花醋拌炒黒色　地龍微炒各一分　赤芍藥三分

右細羅為散每服不拘時以温酒調下一錢

天麻丸 出聖濟錄 治風毒上攻下注遊走不定衝繫疼痛

天麻　地龍去土　羌活去蘆頭　獨活去蘆　桂去粗皮　附子去皮臍生用　没藥研　荆芥穗各二兩　麝香研一錢

右為末生蚕和丸如櫻桃大瓷器内收每服一丸用荆芥臘茶嚼下如注破脚至甚者不過二十日上攻則食後服下注則食前服

烏頭散出聖惠方　治風走注疼痛及手足拘急頭疼不可忍

川烏頭炮去皮臍　乾薑炮製　川椒去目及閉口者微炒去汗　硃砂細研　細辛　桂心各半兩　天雄炮製去皮臍　莽草微炙　雄黄細研各一兩

右細羅為散每服不拘時以温酒調下半錢

桂心散出聖惠方　治風走注疼痛

桂心　地龍微炒　白殭蠶微炒　漏蘆　葳靈仙　芎藭

白芷　當歸　木香已上各半兩

右細羅為散每服不拘時以熱酒調下二錢

乾地黄丸出聖劑總録　治走注疼痛

生地黄焙　白芷　當歸切焙　没藥研　防風　烏頭炮製

去皮臍　木香　赤小豆炒各等分

右為末水浸蒸餅心和丸如梧桐子大每服五丸冷

酒下空心食前服日二

應痛丸出聖劑總録 治風毒内攻走注疼痛不定

五靈脂者炒黑色 地龍炒去土 白芥子 草烏頭生用去皮臍

自然銅各一兩煆醋淬研 乳香錢研半 巴豆膜醋煮黄色七枚去皮心

右為末酒煮麪糊和丸如小豆大每服五丸温酒下

葳靈仙丸出聖劑總録 治風氣走注疼痛無常處

葳靈仙土去苗 五靈脂兩各一 烏頭皮臍炮去 木鼈子殼去 乳

香半兩研各 芍藥

右為末滴酒和丸如梧桐子大每服七丸食前冷酒下加至十丸


活絡丹　治一切痛風走注渾身疼痛方見諸風雜治類

漢椒散出聖惠方　治風走注疼痛及白虎歷節風等

漢椒去目及閉口者微炒去汗　側子炮去皮臍各一兩　桂心　麻黄去根節　當歸　木香各一分

右細羅為散每服不拘時以温酒調下半錢

治風走注疼痛不定隨痛處熨之



芫花 漢椒（去目） 桑根白皮（各二兩） 柳蚛屑 桂心（一兩）

麩（一升）

右用醋一升拌炒令熱以青布裹熨痛處冷即更入醋重炒依前熨之以差為度

又方（出聖惠方）

針砂（五兩） 砒霜 硇砂 雌黄 磁石（各半兩） 麝香（一分）

右為末臨時以醋拌炒令熱用熱帛裹熨患處立差

羌活丸（出王氏博濟方） 治風毒走注疼痛及體内多風疾者

羌活 獨活去蘆頭各二兩 地龍去土炒一兩 天麻三分 烏頭炮製去皮臍半兩

右為末用生蜜和丸如梧桐子大每服二十丸薄荷湯或温酒下食前服

莎草根丸出聖劑總録 治風走注循入經絡及腰膝疼痛

莎草根用猪胆炒令香 草烏頭用淨水浸一半炒去皮尖各二兩 劉寄奴一兩 葳靈仙去土 躑躅花各半兩

右為末用乳香没藥各半兩入醋煮麵糊和丸如梧

桐子大火煅自然銅研為末每服五丸漸加至十丸

煨葱酒下

仙靈脾散 治風走注疼痛往来不定

仙靈脾 威靈仙 芎藭 桂心 蒼耳子各二兩

右細羅為散每服不拘時候以温酒調下一錢

神效膏 治風走注疼痛上下不定隨處貼之

牛皮膠水溶作膏一兩 芸薹子 安息香 附子生去皮臍 漢

椒生用各半兩

右細羅為散入膠中和成膏塗紙上隨貼之立定

烏頭丸　治走注疼痛不可忍

烏頭炮去皮臍　乾蝎去土炒　地龍去土炒　蝍蠋花去心各等分

右為末醋麪糊和丸如菉豆大每服五丸婦人當歸酒下男子荊芥酒下

治風走注疼痛

水銀一兩　棗十五枚蒸熟取穰和水銀研星盡　天南星炮三分　乾蝎半兩

羌活三分

右為末入水銀棗一處研和丸如小豆大别以膩粉拌令日色陰乾每服不拘時以豆淋酒下五丸一方無羌活

趁痛丸 治風毒留客日深氣虚邪實攻繫不定走注疼痛

大戟皮刮去 甘遂 白芥子各一兩

右為末用大麥麪一兩和勻醋調作餅子慢火炙黄熟再擣羅用薄麪糊為丸如梧桐子大每服十丸漸

加至十五丸空心冷酒下病痛甚不入大麥麪亦得

芸薹子散 治風毒走注疼痛如虎囓

芸薹子 天南星 草烏頭並生各一兩

右為散每用五錢匕量入生麪一醱醋生薑汁各少許調成膏攤紙上厚一分貼痛處即止

消毒膏 治風毒走注疼痛筋脉攣急

馬牙硝燒赤研一兩 烏頭大者二枚燒存性三分研

右同研令勻每用三錢匕白麪三錢匕生薑汁一盞

同熬成膏攤於帛子上熱貼日二換之

治風走注疼痛

地龍（微炒一兩）麝香（細研入一分）

右細羅為散每服不拘時以温酒調下一錢

芥子膏　治風毒走注疼痛及白虎歷節風

用芥子為末鷄子白調傅之一方治中風口噤舌本縮無鷄子白用醋調塗頷下及傅頸周圍立效一方

芥子同酢煮傅之

虎骨木瓜丸　治飲酒過度寒濕停滯經絡不和傷敗氣血走注筋骨疼痛晝靜夜甚或冒所傷亦治筋骨走注并婦人血風疼痛並治之

虎骨酥炙　南乳香研　没藥各一兩　木瓜　天麻　蓯蓉　牛膝已上四味各二兩用好酒浸十日取出焙乾

右為細末將原浸酒作糊為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心食前溫酒送下日進二三服

透骨膏　治一切風濕走注疼痛

生地黄 馬鞭草各半斤 吳茱萸 白麪各三兩 骨碎補 乾生薑屑各四兩 鼈甲二個炙 蒲黄二兩

右為細末用米醋調似膏子於火上温熱攤於痛處用飯裹蒸候冷再炒如此七次於避風處用

地黄丸 大治走注風及風氣四肢倦怠不思飲食出大全集謂之四聖丹

熟地黄洗剉焙 當歸上同 玄參並上同 羌活剉焙揀節種者

右四味各等分為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

三十丸或温酒鹽湯空心食前服藥良久仍進飲食忌豬鷄羊以羌活之故忌熱麵以當歸之故忌羅蔔以地黄之故忌猪羊血以耗藥力之故餘皆不忌

治走注風散血止痛

以石鷩節搗篩末酒温服之

治走注風

用建水草葉焙乾碾末煖酒服

風入腹拘急切痛論

夫風入腹拘急切痛者風邪搏於陰經也風邪搏於陰經則腸縮踡腸縮踡則絀急風寒之氣與正氣相繫故裏急而切痛也

方

竹瀝湯　治風毒入人五内短氣心下發熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不言

竹瀝（一斗九升）　防風　茯苓　秦艽（各三兩）　當歸　黄芩　一方作芍藥　人參　芎藭（一方作防已）　細辛　桂心　甘草

升麻一方作通草 麻黄 白术各二兩 附子二枚 蜀椒一兩

葛根五兩 生薑八兩

右㕮咀以竹瀝煮取四升分五服初得病即須摩膏

日再痺定止一方無麻黄蜀椒生薑

大巖蜜湯出聖惠方 治賊風腹中絞痛幷飛遁注發作無

時發即搶心脹滿脇下如錐刀刺并主少陰傷寒

梔子十五枚 甘草 乾地黄 細辛 茯苓 羊脂

青羊角亦得 吴茱萸 芎藭小器用芎藭 乾薑 當歸 桂

心各一兩

右㕮咀以水八升煮取三升去租内脂令拌分三服

温酒服如人行十里頃若痛甚者羊脂三兩當歸芍

藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大黄三兩一方

不用梔子羊脂茯苓桂心名嚴蜜湯一方無羊脂用

水酒煎服名乾薑散

乾地黄湯出聖濟錄　治風入腹兼尸疰入心腹㽲痛氣短

喘息不得宜服

熟地黄焙一兩　當歸焙一兩半　芍藥一兩半　甘草炙剉　人參

桂去粗皮　附子炮去皮臍　厚朴去粗皮塗生薑炙煙起各一兩　細辛去苗葉

乾薑炮各兩半　吴茱萸湯洗焙乾炒三分

右粗擣篩每服三錢匕以水一盞煎去滓取七分空

腹服日三夜一

天雄散出聖惠方　治風入腹臟腑中切痛拘急

天雄炮去皮臍　當歸　桂心　木香各一兩　雄黄細研　地黄

微炒　乾蝎生用　硃砂細研各半兩　獨活三分　麝香細研一分　天南星

微炒 半兩

右細羅為散入研了藥令匀每服不計時以温酒調下一錢

烏頭散 出聖惠方 治風氣入腹拘急切痛煩冤不可過時

川烏頭 炮去皮臍 黄芩 各一兩 乾薑 炮剉 人參 去蘆 天雄 炮去皮臍

甘草 炙各半兩 當歸 剉炒 白术 漢防已 各三分 細辛 三分

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候少熱服之

甘草湯出聖劑總錄　治風入腹中疞痛并飛遁注發作無時發則搶心脹滿脇下如錐刀刺

甘草炙剉　細辛去苗葉　乾薑炮　當歸切焙　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　赤芍藥　吴茱萸湯洗焙炒　熟地黄切各一兩

右粗擣篩每服五錢匕以水一盞半入切羊脂少許同煎至八分去柤空心日午夜卧服

人參湯一名茵芋散出聖惠方　治風入腹拘急疞痛

人參一兩　附子炮去皮臍一兩半　麻黄去根節一兩半　防已三分　茵芋

一兩（去苗）黄芩一兩（去黑心） 防風（去叉） 芎藭（各三分） 甘草（炙三分）

右粗擣篩每服三錢匕以水一盞生薑三片煎至七分去粗少熱服不計時候

附子散（出聖惠方） 治風入腹疞痛無時發則搶心脹滿拘急

附子（炮去皮臍） 細辛 甘草（炙） 當歸（剉微炒） 桂心 赤芍藥 生地黄 青橘（湯浸去白微炒各一兩） 吴茱萸（湯浸七遍焙乾炒半兩）

右粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去粗不計時候稍熱服

甘草飲出聖劑總録　治風入心腹疞痛脹滿拘急不得息并轉筋温中止痛利大小便

甘草炙　防風去叉各一兩半　吳茱萸湯浸炒　赤芍藥　當歸焙　細辛去苗　乾薑炮各一兩　熟地黄一兩一方作生

右粗擣篩每服五錢匕以水一盞半煎去滓取八分空腹温服日二服一方有桂心無甘草名防風湯聖

惠方名桂心散

鬼箭湯 出聖劑總録 治風入腹攣急及賊風所中

鬼箭羽 如鷄子大一塊 甘草 一尺炙剉 石膏 如鷄卵一塊 麻黄 去根節沬焙四兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去柤空心臨卧各一服慎外風一方吹咀以東流水煮服之

桂心湯 出聖濟總録 治風入腹五臓拘急四肢不隨腹滿欲絶

桂去粗皮　防風去叉　黃芩去黑心　乾薑炮　秦艽去苗根　吳茱萸湯浸炒　甘草炙剉各一兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去柤温服不拘時候服後忌海藻菘菜生葱

烏頭湯出千金方　治寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥逆

烏頭十五枚要畧用五枚　大棗十枚　甘草二兩　芍藥四兩　桂心六兩　老薑一斤

右㕮咀以水七升煮五味取三升去滓別擣烏頭去皮餺破蜜二升微火煎令減五六分内湯中煮兩三沸去滓服一合日三間食彊者三合以如醉狀為知不知增之一方無大棗

赤芍藥散出聖惠方治風入腹攻五臟拘急不得轉側陰縮手足厥冷腹中㽲痛

赤芍藥　桂心　甘草各炒微赤剉　防風去蘆頭　芎藭各一兩

烏頭炮製去皮臍二兩

右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去柤不拘時候稍熱服

理中湯出聖濟總錄　治風入腹心腹疞痛痰逆惡心或時嘔吐隔塞不通

人參　乾薑　甘草炙剉　白朮各二兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓稍熱服空心食前服

治中風寒熱腹中絞痛

以乾鯽魚一頭作末三指撮以苦酒服之温覆取汗良

食鹽方　治中風但腹中切痛

以鹽半觔熬令水酒著口中飲熱湯二升得吐愈

普濟方卷九十八

欽定四庫全書

子部

普濟方卷九十九 一百

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官編修臣嚴福

謄録貢生臣秦聯登

普濟方卷九十九

明 周王朱橚 撰

諸風門

癲癇論

夫癲癇之疾諸方所載並作一證治之愚謂癲與癇難以一槩而論故癲者全歸於心癇者歸於五臟所謂癲者神不守舍狂言妄言如有所見動經年歲不得即愈若心經有損是為真病如心經蓄熱則當清心除熱如

痰迷心竅使然又當下痰而寧其心志婦人因血氣迷心或因產後惡露上衝而語言錯亂神志不守者各當隨其證治其癲癇病者旋暈顛倒吐涎沫搐搦騰踴作馬嘶鳴多因挾熱夾驚心動膽懾鬱涎流入心之所致也名曰馬癇以馬屬在午手少陰君火主之故其病生於心經病者暈眩四肢煩疼昏悶顛倒掣縱吐沫作羊叫聲多因少時臍瘡未愈數洗浴濕襲脾經之所致也名曰羊癇以羊屬未坤位足太陰濕土主之故其病生

於脾經病者昏暈顛倒兩手頻伸叫作雞聲須臾即醒
醒後發多因少時燥氣傷胃煩毒內作鬱涎入胃之所
致也名曰雞癇以雞屬酉足陽明燥金主之故其病生
于胃經病者眩暈顛倒眼目相引牽縱急强作猪叫鳴
吐涎沫食頃方已多因少小吐利挾風之所致也名曰
猪癇以猪屬亥手厥陰心胞絡風木主之故其病生於
右腎經病者眩暈顛倒目反口禁瘛瘲吐沫作牛吼聲
多因少小濕熱傷肺涎留肺系遇燥熱則發動名曰牛

癇以牛屬丑手太陰濕土主之故其病生于肺經思夫癲癇病者皆因驚動使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成或在母胎中受驚或少小感風寒暑濕或飲食不節逆於臟氣詳而推之三因備具風寒暑濕得之外驚恐震懾得之内飲食飢飽屬不内不外三因不同忤氣則一傳變五臟散及六腑溢諸絡脉但一臟不平諸經皆閉隨其臟氣證候殊分所謂象六畜分五聲氣色脉證各隨本臟所感所成而生證諸古方有三癇五臟

癇六畜癇及至一百二十種癇以其禀賦不同臟腑強弱性理燥靜故諸證蜂起推其所因無越三條病由都盡矣三因方云五癇合屬五臟而無腎有胃者以腎屬鼠非畜養物神無主治故不作癇胃屬雞繫六畜物故有象兼胃為五臟海非餘府比又犬屬戌手少陽三焦經主之雖屬六畜無犬癇者以辰戌為魁罡四煞無處不興癇之象也

方

虎睛丸出千金方 治風癲癇瘛瘲反張口出白沫或作猪聲不知人

虎睛一對酒浸炙令黃入藥擣 白茯苓去黑皮 龍齒別研各一兩一分 防葵剉 秦艽去苗土 升麻 防已剉各一兩 獨活去蘆頭三分 遠志去心 鬼箭羽 白蘚皮各三分 鐵精擣研 防風去叉各一兩 鬼臼 貫衆去土木 細辛去苗葉炒各三分 大黃剉醋炒 山茱萸 人參各一兩 白薇炒二兩一作白斂 天雄炮製去皮臍 銀薄別研各三分一作銀屑 蛇蛻皮一尺炙 凝水石別研 石膏別研各一兩一

分飛鵶頭三枚去觜毛炙麝香別研牛黄別研乾薑炮一作乾地黄芎藭露蜂房炙各半兩黄芩去黑心一兩

右擣羅為末次將別研等入末中拌和令匀鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸温酒下日二夜一如心肝覺風熱上衝用竹瀝飲下一方有茯神雄黄無芎藭飛鵶頭

龍膽丸　治癲癇狂悖迷亂心神恍惚四體抽掣吐沫嚼舌

龍膽去土　鈎藤　升麻　犀角鎊　玄參　黄芩去黑心

白茯苓去黑皮　防風去叉　秦艽去苗土　地骨皮剉　大麻仁研膏同搗　檳榔剉　黄連去鬚炒　馬牙硝研　麥門冬去心焙　龍齒別研　甘草炙剉　大黄剉炒　天竺黄別研　琥珀別研　珍珠末別研各一兩　青黛二兩別研　蜣螂三十五枚去頭生用　金薄七十片與丹砂同研　牛黄研半兩　蚱蟬三十五枚去頭足生用　銀薄一百片與金薄丹砂同研　鐵粉一兩一分別研　虎睛一對酒醮炙燥去皮搗　丹砂三分別研入金銀薄同研

右除十二味別研外餘藥搗羅與研者藥末合研匀

鍊蜜和丸如菉豆大每服十丸食後煎人參茯苓湯下日三服小兒三丸至五丸

防葵散 治癲癇厥時發作

防葵 代赭 人參 鉛丹 白殭蠶 生豬齒 茯神 雷丸 鉤藤 虎骨 遠志 桂心 防風各六分 卷栢 莨菪子 光明砂 升麻 附子 牡丹 龍齒各一兩一分 牛黃二分 白歛四分 蚱蟬十四枚 蛇蛻皮 白馬眼睛各一具

右治下篩酒服方寸匕日二亦可為丸良驗一方治風癲精神錯亂發作無時無莨菪子桂心二味有虎掌湯洗以生薑汁拌炒黄用

羚羊角丸出聖濟總録　治風癲癇

羚羊角鎊　犀角鎊　遠志去心焙　人參　山芋　茯神去木各一兩半　生乾地黄焙乾令搗三兩　防風去叉一兩三分　金薄研　銀薄研各一百片　麥門冬去心焙　鐵粉研　天門冬去心焙各三兩　水銀一分入金銀薄龍齒鐵粉五件同研水銀星子盡為度　龍齒研一兩

右先將一十味擣羅為末入别研者相拌令匀鍊蜜和丸如菉豆大用桃柳枝湯下二十丸日二夜一或人參茯苓湯下亦得

治百二十種風癲癇驚狂發即吐沫不識人者四月五月並宜服之出千金方

紫石英 芍藥 龍骨一本用黄芩 青石脂 白蘚皮 麻黄 當歸 甘草 括蔞根 桂心 人參各二兩 牡蠣三兩 大黄五兩

右為散分作七裹每裹以大棗十枚水三升煮取二升半去滓下一裹大棗汁中煎取一升去滓頓服相去七日一服服乾即瘥


龍腦安神丸出濟生拔粹　治男子婦人小兒五積癲癇無問遠日近日發作無時服諸藥不効但服此藥無不痊愈

茯神去麄皮取末　人參去蘆頭　麥門冬去心　烏犀取末　硃砂飛各二兩　甘草取末　桑白皮取末　龍腦另研　牛黃另研　麝香研各三錢　真

地骨皮各一兩 馬牙硝另研一錢 金薄三十五片

右為細末煉蜜丸如彈子大金薄為衣如有風癇病多歲冬月用温水化下夏月凉水化下不拘時候多歲病服如二三年病日進三服小兒一丸分作二服又治男子婦人虛勞發熱喘嗽新汲水一盞化開服其喘滿痰嗽立止又治男子婦人語澁舌強日進三服食後温凉水化下

五癇丸出醫方大成 治癲癇發作不問久年新日病宜服



之

全蝎一錢去毒炒　半夏二兩湯洗七次　雄黃一錢半別研　天南星炮一兩　蜈蚣半條去頭足炙　烏蛇一兩酒浸一夕去皮骨焙乾　麝香二錢別研　白附子半兩炮　白礬一兩　皂角四兩搗碎水半升將汁與白礬一同熬乾研　白殭蠶一兩半炒去糸　硃砂一分別研

右為末薑汁煮麪糊丸如梧桐子大每服三十丸薑湯下

五膽丸　治心風狂走癲癇

鯉魚膽　雞膽　狗膽　猪膽　羊膽各一箇傾汁作一處

蛇黄五兩火煅醮膽汁盡為度

右為末別以狗膽汁為丸如菉豆大硃砂為衣服十五丸以磨刀汁吞或只作末將磨刀水調亦可食後服

蛇黄丹出三因方　治五臟六腑諸風癲癇掣縱吐涎沫不識人及小兒急慢驚風

蛇含四枚建窑盞内煅紅以楮樹汁一盌淹乾　天南星炮　白附子　辰

砂（別研）麝香（別研，各半兩）

右為末，糯米糊丸如梧桐子大。每服温湯磨化一丸，量大小與服。大人嚼細三五丸，温酒米湯任下。

抱膽丸（出危氏方）治男子婦人一切癲癇風狂，或因驚恐怖畏所致者，及婦人產後血虛，驚氣入心，并室女月脉通行，驚恐蘊結。此方累曾經効，本是忠懿王之子有疾，忽得一僧授此，服之即効，本名靈妙觀音丹。忠懿得之，未敢輕信，忽有一風犬，飼以此藥，立効，破犬

腹而視其藥乃抱犬膽因易今名

水銀二兩 硃砂一兩細研 黑鉛一兩半 乳香一兩細研

右將黑鉛入銚子内下水銀結成砂子次下硃砂滴乳乘熱用栁木槌研勻丸如雞頭大每服一丸空心井花水呑下病者得睡切莫驚動覺来即安再一丸可除根本

治癲癇瘈瘲出千金方

鉛丹一斤 飛鴟頭二枚

右為末蜜丸先食服三丸日三劇者夜一稍加之

乳硃丹一名二靈丹　治癲癇驚瘸出濟生方

乳香別研　硃砂細研水飛

右用乳香鎔化拌和硃砂為劑丸如龍眼大每服一丸側栢葉浸酒磨化盪温服不拘時候

奪命散　治壓風疾癲癇

用青礞石好者一兩入甘鍋内同焰硝一兩拌匀用炭火煆通紅須化盡為度冷則色如金取研為末每

服一錢用薄荷自然汁入蜜調微温服之良久其藥自裹痰逐下隨大便夾和稠粘如膠乃藥之功

驅風丸（一名驅風散） 治五癲百癇無問陰陽冷熱（出三因方）

虢丹 晉礬（各一兩）

右用磚鑿一窠可鎔二兩許先安丹在下次安在上以白炭五斤煅令炭盡取出細研以不經水猪心血為丸如菉豆大每服十丸至二十丸橘皮湯下一方為散温酒調下

大鎮心丹出三因方 治一百二十種癲癇驚狂譫妄顛倒昏悶不知人噴吐涎沫及治心驚膽寒清清不睡或

左脇偏疼

辰砂用黄松節酒煮 龍齒用遠志苗醋煮

右只取辰砂龍齒各等分為末猪心血為丸如雞頭大每服一丸以麥門冬黒豆燈心生薑白蜜水煎豆熟為度臨卧嚥下小兒磨化半丸量歲數與之

金砂丸出聖惠方 治風癲邪癇等疾精神不守言語錯亂

金五兩剉屑為藥匱丹砂三兩將金屑置以定州細瓷合子內作一坑子置丹砂于金屑中心上下覆襯以合蓋又用六一泥固濟以慢火養七日將出丹砂掘一地坑子同入淨濕土內單帛裹著在土中出火毒七日用

右去金取砂出火毒後研取粉乾控粟米飯爛研和拌得所丸如菉豆大每食後金銀湯下五丸中夜一服桃柳湯亦得其合子用金者為佳

甘遂散出危氏方 治癲癇及婦女心風血邪

用甘遂一錢為末以猪心取三管血三條和末多少

和之將心批作兩片入在内再合線縛定外用皮紙
裹濕慢火煨熟不可焦過取藥細研入辰砂末一錢
和匀分作四丸每服一丸將所煨猪心煎湯化下再
服别用猪心亦可過半如大便下惡物後調和胃氣

神應丹出衛生寶鑑 治諸癲癇

用辰砂不以多少細研水飛過候乾用猪心血和之
得所以蒸餅劑裹蒸熟為度取出就熱便丸如梧
桐子大每服一粒食後臨卧温人參湯下不數服取

効如神一方用金銀湯下

陳蒲飲　治卒發風癲狂癇

用三年陳敗蒲一兩切細以水二升煎至七合去滓

温飲

治癲癇并風狂久不瘥者出海上方

用黄丹火上飛過不拘多少用蒸餅為丸如梧桐子

大每服五十粒人參湯下日三四服

牛黄丸出聖濟總録　治風邪變成癲癇時時發動不知人

事定心神風癲之狀發無常時每發則仆地吐涎沫
無所覺知蓋由血氣皆虚精神離散䰟魄失守風邪
入於陰經故也又以胞胎之初其母卒大驚精氣并
居能令子發癲其證與風癲大率相似

牛黄別研 真珠末別研 琥珀別研羅 鐵粉別擣研 天竺黄別研 龍齒別研各半兩 金薄七十片同水銀研 銀薄七十片與水銀同研 水銀與金薄同研 犀角鎊研 丹砂與水銀金銀薄同研各半兩 露蜂房 龍膽去土 升麻 防風去叉 黄芩去黑心 鈎藤各半兩 知母細切焙 天

門冬去心焙 白芍藥 茯神 甘草炙剉 菖蒲九節者米甘浸剉去皮切酒炒 麥門冬去心焙各一分 乾蝎酒炒一兩 麝香别研 人參各半兩

右除别研石藥及麝香等外餘藥擣羅與研藥再羅令勻煉蜜拌和得所更擣千杵丸如桐子大夜卧及食後煎新竹葉湯下十五丸至二十丸

治癲癇發熱急狂走出本草

以鐵漿服之

治驚邪癲癇雞癇發熱狂走出本草

取鳳凰臺石水磨之服是鳳樓正處脚下物如白石也

治大風癩癇頭風濕痺毒在骨髓久服益氣耳目聰明輕身强志亦治腰膝中風毒出本草

取蒼耳三月已後七月已前刈日乾為散夏水服冬酒服日服二丸服二三十丸散一二匕滿百日病當出如瘑疥或痒汁出或班駮甲錯皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡忌食猪肉米泔

療癲癇出本草

以野猪黄水研如棗核日二服効

治癲癇

用艾于陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之

癲論

夫黄帝問曰人生而病癲疾者安所得之岐伯對曰此得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且

寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癲初發歲一發不治月一發不治四五日一發名曰癲疾刺諸分其脉尤寒者以針補之病已止癲疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而已癲疾如發而反强因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已癲疾始作而引口啼呼甲乙作喘悸者候之手陽明太陽右强者攻其左左强者攻其右血變而止癲疾者常與之居察其所當取

之處病至視之有過者即瀉之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者尾骶也

治癲者病發而狂面皮厚敦者死不療　凡癲發則卧地吐涎沫無知若强掠起如狂及遺糞難療癲疾脉搏大滑久自已脉沈小急實死不療小牢急亦不可治脉虛可療實則死矣厥成為癲疾五臟不平六腑閉塞之所生也厥成為癲故附厥於此條也陰衰發熱厥陽衰發寒厥　黄帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽

氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣起於足三趾之表集於足下而聚於足故陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於趾而上於膝者何對曰陰氣起於五趾之裏集於膝而聚於膝上故陰氣勝則從五趾至膝上寒其寒也不從外皆從內也厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也陰氣勝於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則

不知人巨陽之厥腫首頭重足不能行發為眴外陽明之厥癲疾欲走呼腹滿不能卧面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾頰腫而熱脇痛髀不可以運太陰之厥腹滿䐜脹後不利下欲食食嘔不得卧少陰之厥舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥小腹腫痛腹脹經溲不利好卧屈膝陰縮腫胻内一作外熱盛則瀉之虚則補之不盛不虚以經取之上寒下熱先刺其項太陽久留之已則火熨項與肩甲令熱下冷乃止所謂推而上之者也上

熱下寒視其虛脉而陷下於經絡者取之氣下而止所謂引而下之者也刺熱厥者留針反為寒刺寒厥者留針反為熱刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陰者二刺陰也所謂二陽者二刺陽也　温病熱於腎中亦為痓小兒病癇熱盛亦為痓凡風瘖暴尸厥及鬼魘不寤皆相似宜精察之故經言久厥則成癲是以知似也　癲病有五一曰陽癲發時如死人遺溺有頃乃解二曰陰癲坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此

得之三曰風癲發時眼目相引牽縱反急强羊鳴食頃方解由熱作汗出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭重痛身重坐熱沐髮濕結腦汗未止得之五曰馬癲發時反目口噤手足相引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之　骨癲疾者頷齒諸腧分肉皆滿而骨倨强直汗出煩悶嘔多涎沫氣下泄不利　筋癲疾者身拳攣急脉大刺項大經之本杼多嘔涎沫氣下泄不療　脉癲疾者暴仆

四肢之脉皆脹而縱滿脉盡刺之出血不滿俠項灸太陽又灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本腧嘔多涎沫氣下泄不治　癲狂之疾何以别答曰狂之始發少卧不飢自賢自貴妄笑好歌樂又曰癲者精神不守言語錯亂甚則登高駡詈或至狂走癲者發則卧地嚼舌吐沫手足搐搦或作六畜之聲頃刻則甦癲者邪入於隂則癲狂者邪併於陽則狂癎者邪干於心其處用藥亦皆相類　凡人患癲狂者叫呼打人者皆心經有熱當用

鎮心藥加大黄與之瀉數行然後用安神及風藥但得寧靜即是安妥不可見其瘦弱減食便以温藥補之補之病必再作當戒之緩緩調治飯食可也　因驚癲狂軍中有犯法者褫衣將受刃忽然得釋神失如癡與驚氣丸一粒服訖而寐及覺病已失矣　風癲者由血氣虚風邪入於陰經故也人有血氣少則心虚而精神離散魂魄妄行因為風邪所傷故邪入於陰則為癲疾夫人見十步垣墻勿順墻而卧風利吹之人必發癲癇

及體重人卧春夏向東秋冬向西此是常法

方

麝香丸出聖濟總録 治風癲瘛瘲口眼翻張口吐白沫或喉中作聲不知人

麝香別研半兩 虎睛一對炙令燥去外皮 防風去叉一兩 龍齒別研 黄芩去黑皮 鐵粉研 鬼臼各三兩 人參 大黄剉醋炒各一兩 牛黄別研一分 秦艽去苗土 雄黄二兩別研 各獨活去蘆頭 凝水石別研各一兩 茯神去木一兩一分 升麻三分 石膏別研一兩一分 遠志去心半兩

天雄炮裂去皮臍用一兩一分 白蘚皮三分 露蜂房炙一分 細辛去苗葉三分 貫衆擣去土末 鬼箭羽各十兩 蛇蛻炙一分 金薄 銀薄各四十九片研

右先將一十八味擣羅為末後入别研九味和勻錬蜜為丸如梧桐子每服十五丸至二十丸空心日午臨夜温酒下

虎睛丸出聖惠方 治風癲口眼開張多吐白沫或作惡聲恍惚虛悸

虎睛一對酒浸炙微黃　茯神一兩　龍齒一兩　石膏一兩　防風一兩去蘆頭　黃芩一兩　秦艽一兩去苗　川升麻一兩　漢防已一兩　鐵粉一兩細研　川大黃一兩剉碎微炒　人參一兩去蘆頭　防葵一兩　獨活一兩　遠志三分去心　白鮮皮三分　鬼臼三分　細辛三分　銀薄　金薄各五十片細研　天雄三分炮製去皮臍　乾薑半兩炮製剉　芎藭三分　麝香半兩細研　露蜂房半兩　牛黃半兩細研　蛇蛻皮十條燒灰

右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大不計時候以溫酒下二十丸薄荷湯下亦得

麥門冬丸_{出聖濟總録} 治風癲狂亂失心安䰟定志

麥門冬_{去心焙一兩} 虎睛_{一對微炙} 龍齒_{研一兩} 金薄_{一百片研} 銀薄_{一百片研} 石膏_研 升麻 枳實_{麩炒} 生薑_{切炒黑} 白茯苓_{去皮} 人參_{剉各一兩} 元參 葳蕤_炒 芍藥 甘草_{炙剉} 遠志_{去心各三兩} 栢子仁_{生用} 薤白_{細切焙乾} 牛黄_{别剉各半兩}

右除虎睛并别研六味外餘擣羅再與研者同羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎地骨皮湯下日三夜一不拘時候

茯神丸出聖濟總録　治風癲癔瘲神魂不定

茯神去木　龍骨　龍齒　龍角三味去土一處　龍膽去苗土　鐵精搗研入前三味同研　蔓荆實揉去白皮各一兩　乾薑炮　人參　遠志　黄連去須炒各三分　大黄剉醋炒一兩半　芎藭　白芷　當歸切焙　黄芩去黑心　桂去麄皮各半兩

右先將一十三味擣羅為末入别研者四味和令匀鍊蜜丸如梧桐子大每日空心及日午食前用蜜湯下十五丸漸加至二十丸

銅青丸 治五癩方見癇類

侯氏黑散出金匱方 療風癩大風四肢煩重心中惡寒不足者

菊花四十兩 防風 白朮各十兩 茯苓 細辛 牡蠣熬 鍾乳研 礜石泥裹燒半日 人參 乾薑 桂心 芎藭 當歸 礬石如馬齒者燒令汁盡各三分 黄芩五分

右擣合下篩以酒服方寸匕日三忌桃李雀肉胡荽青魚鮓酢物生葱生菜一方有桔梗八分無鍾乳礜石

石以温酒下之禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力

治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴出肘後方

用天門冬去心皮曝乾擣篩酒服方寸匕若人久服能長生

治風癲及百病出肘後方

用麻仁四升水六升猛火煮令牙生去滓煎取七升

旦空心服或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足須定凡進三劑愈麻仁者今人績布麻種也

治癲狂疾出肘後方

用防葵子末温酒服一刀圭至二三服身潤又小不仁為候　凡使防葵勿悮用狼毒其防葵在蔡州沙土中生採得二十日便蚛用之唯輕為妙欲使先須揀去蚛末後用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黄精自然汁一二升拌了土器中炒令黄精汁盡

治卒癲疾方出肘後方

用葶藶一升擣三千杵取白犬倒懸之以杖犬令血出承取以和葶藶末丸如麻子大一丸三服取瘥温水下

蠶紙散出肘後方　治風癲狂發欲走或自高貴稱神聖皆應備諸火灸百會風池膏肓三里効乃得永瘥耳若或悲泣呻吟者此為邪魅非狂依邪方治之用生蠶紙燒灰酒水任下

續命風引湯出千金方　治中風癲眩不知人狂言舌腫出

麻黃　芎藭　石膏　人參　防風各三兩　桂心

甘草　獨活各二兩　防己　附子　當歸各二兩　杏仁

三十枚　陳薑五兩一方無陳字

右㕮咀以酒三升水一斗合煎取四升分四服日三

夜一

鴟頭丸　治風癲

葶藶子三分　鉛丹　虎掌　烏頭　括蔞根各三分　甘

遂　天雄　蜀椒　大戟各三分　白术一分　鐵精　蔄茹各一兩　鴟頭一枚

右為末蜜丸如梧桐子大溫酒下二丸日三服

茯神丸　治風癲引脇肋牽痛發作吐沫耳中虛鳴

茯神去木一兩一分　龍骨別研　龍角別研各一兩　龍膽去土　鐵精擣研　蔓荆實炒各一兩一分　人參　遠志去心　黃連去須炒　大黃剉醋炒各一兩　芎藭　當歸切焙各一兩　黃芩去黑心一兩

右先將一十味擣羅為末入別研者相拌令勻鍊蜜

丸如梧桐子大食後煎生薑枳殻湯下十丸加至十五丸一方以温酒下

鉛丹丸　治風癲發時吐涎起卧不定及大小便不能知覺

鉛丹一兩　括蔞根一兩　虎掌半兩湯洗七遍生薑汁拌炒令黄　蕳茹一兩

白朮半兩　鐵粉二兩細研　鴟梟頭一枚燒為灰　大戟半兩剉微炒　甜

葶藶一兩隔紙炒令紫　川椒半兩去目及閉口者微炒去汗　天雄半兩炮去皮臍

烏頭半兩炮裂去皮臍

右為末鍊蜜和丸如桐子大不計時候以溫酒下二十丸

治發癲口邊白沫動無常者

秦艽 人參 防葵（一作防風） 茯神（一作牡丹） 甘草（各二兩） 鉛丹（一兩） 貫衆（一枚）

右㕮咀以水九升煮取三升半分三服

六生散（一名菖蒲散） 療風癲

菖蒲 藺茹（一作蔾蘆） 防風 茵芋 商陸根 蜀附

子炮各二兩

右擣篩酒服五錢七日再服不能稍增以知為度忌猪肉冷水羊肉餳牛犬肉蒜

雄黃丸 治風癲失性欲死并理五驚諸癇

雄黃別研 雌黃別研 珍珠末別研各一兩 丹砂別研一兩 水銀二兩

先以蒸熟棗肉二兩研馬尾羅內擦過鉛丹點醋用柳木槌研令青色水銀星盡為度 鉛丹炒一方熬令成屑

右將五味各研如粉後合研用棗肉膏研不見水銀

星為度更入棗膏入臼更擣千杵丸如大麻豆每服二丸至三丸人參茯苓湯下日二夜一食後服之一方治風癎以蜜為丸用薑棗湯下古今録驗云療五癲牛癲則牛鳴馬癲則馬鳴狗癲則狗鳴羊癲則羊鳴雞癲則雞鳴病五癲狂病者腑臟相引盈氣寒厥不識人氣爭言妨吐沫久而得蘓者

雄黄丹砂丸　治五癲病宜服之及治風癲失性倒卧惡聲吐沫口禁方名雄珠丹

雄黄 丹砂 雌黄各二兩碎同用夾生絹袋貯又入十兩蜜内重湯煮待蜜赤色滴如珠引若綫為度取藥囊出河水洗滌淘漉出曝乾入乳鉢中研如粉為度其蜜即丸藥用之最妙

黑鉛二兩大火化用鐵匙攪抹法如塵垢者用精者一兩將無油淨器中下水銀及鉛同銷鎔攪令匀瀉於熟鐵器内候冷先將前三味石藥乳鉢内研次入鉛同研取匀甚良

水銀一兩

右各如前修製畢便將前煮丹砂雄黄雌黄餘蜜再重湯煮少少點入藥中漸漸和匀為丸如大麻粒每用桃柳桑木嫩條各長七寸剉以水一升煎至六合

去滓分温下丸藥空心午時臨卧時下三丸至五丸

小兒一丸至二丸

莨菪子散 療五癲反側羊鳴目翻吐沫不知痛處

猪卵一具陰乾百日 莨菪子三升 牛黄八分研 鯉魚膽五分 桂心十分研

右切以清酒一升漬莨菪子暴乾盡酒止乃擣合下篩酒服五分匕日再當如醉不知稱增以知為度忌生葱

鐵粉散　治風癲心神不定狂走無恒

鐵粉　馬牙硝　光明砂各一兩　鉛霜半兩　金薄五十片

右為散不計時候以生地黄自然汁調下一錢忌生血物

水銀丸　治風癲心神憒亂狂走不恒言語倒錯

水銀一兩　硫黄一兩與水銀結為砂子　硃砂　定粉　黄丹各一兩

右細研入甆罐子內以泥封頭候乾以慢火養一復

時取出入金銀薄各五十片雄黄鉛霜各一分同研令細以糯米飯和丸如菉豆大不計時候以豆淋酒下五丸

丹砂煎 治風癲疾時發時省涉歷年月

丹砂細研水飛濾過後焙乾炙研如粉三兩 石膏五兩細研 黄連去鬚擣篩一斤 生地黄不計斤兩研取自然汁二升不得入水重

右以清水一斗煮生石膏黄連取五升浄滓子刺用生地黄汁又煎之如稠餳始下火取丹砂粉投入匀

攪百餘徧貯於不津器中夏攪待冷即住每日兩度

以温水調服約如半彈丸大服藥後只得喫淡飯蔓

菁菜等

鐵精散 療五癲

鐵精一合 芎藭 防風各一兩 蛇床子五合

右合擣篩酒服一錢匕日三有効

芎藭湯出聖濟方 治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴

狂走恍惚

芎藭　藁本　藺茹各五兩

右㕮咀内酒一斗煮取三升頓服之羸者分再服取大汗一方以水煎不計時候温服

天門冬煎出千金方　治風癲卒發仆地口吐涎沫不省人事

天門冬淨洗浸兩日去心細切七斤　生地黃三十斤肥者淘洗細切

右細切都于木臼中擣爛却入大沙盆内爛研壓取汁絞滓乾別收將滓更研極爛入煎湯一斗研攪令

匀又壓滓乾再研極細入湯八升壓滓又再研入湯六升壓令盡乾無味即住取第二第三度研入者汁同煎至一斗次入第一藥汁煎成膏若稠餳即止每服一匙用酒化下或桃柳湯温水化下食後服

烏巴丸出經驗良方　治癲邪結熱狂亂不辨尊卑叫醜罵

用巴豆五粒去殼烏梅五箇去核焙乾同研匀滴水研為丸粟米大硃砂為衣大人三五丸加至十五丸

量大小加減淡薑湯夜卧吞下通利三五行病去白粥補之

鬱金丸出危氏方　治癲狂可畏數年不愈多因驚憂得之痰涎留於心竅

蟬肚鬱金七兩真蜀川來者　明礬三兩

右為末薄糊為丸如梧桐子大每服五十丸湯水任服初服覺心胷間有物脫去神氣洒然再服稍甦多服此藥大能去痰一方治癎用生薑汁糊為丸仍以

生薑湯送下

治諸癩風等疾

用鯉魚一斤治淨加成塊用明礬末四兩醃一兩日煎喫其疾必愈

莨菪丸出聖濟總錄　治風癩如纔得病者服藥三日愈間日發者十日愈五日發者二十日愈半年一發者服一月愈


用莨菪子淘去浮者三升以新汲水淘三十徧浮者

盡去生研如膏入酒一升同研絞取酒又研如膏更入酒一升研絞取酒又研如前絞取酒都及三升更濾一徧入無油淨鐵器中煎成膏却將莨菪滓炒令焦黃乾擣羅為末待其煎成即漸漸少入末和煎令可丸如梧桐子大空心午時夜卧各用温酒下十丸如未覺効加至十五丸額上手中從文理中赤是覺効也即減藥服之凡癲疾發則仆地吐涎沫無知彊掠起如狂反遺糞者難治

瓜蒂散出直指方 治風癲宜服此藥吐之保命集

用瓜蒂末一錢熟水調下吐痰如吐不止者以真麝香少許温水服之一方獨聖散治諸風隔實諸癇痰涎津液湧溢雜病亦然瓜蒂一兩右剉如麻豆大炒令黄色為細末每服量虚實久新或三錢藥末茶一錢酸虀汁一盞調下若用吐法天氣晴明陰晦勿用如病卒暴者不拘於此法吐時辰午已前故内經曰平旦至日中天之陽陽中之陽也論四時之氣仲景

曰大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣卯辰寅候也故宜早不宜夜也先令病人隔夜不食服藥不吐再用熟虀水投之如吐風癲病者加全蝎半錢微炒如有虫者加狗油五七點雄黄末一錢甚者加芫花末半錢立吐其虫如濕腫滿者加赤小豆末一錢故此不可常用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑



治卒發癲狂出本草

用經死繩燒為末服三指撮三年陳蒲水煮服之亦佳

治狂癲不能語不識人者出本草

以生驢脂和酒服三升良

治驚悸癲邪安神定魄强志出本草

用天子籍田三推犂下土水服

治邪狂癲大叫奔走

蝦蟆一枚已首去腸中滓令淨將腸胃却入腹中入瓶子中固濟漸以火燒通赤以土罨定隔日取出入麝香一錢用同研令細每服新汲水調下一錢

治去風痰癲狂除瘟痺

用天門冬末服方寸匕日三無間山中人間常勿廢久服釀酒服之

治狂癲不識人不能語者

以水服伏龍肝方寸匕

導引法

養生方治欬逆胷中病寒熱癲疾喉不利咽乾咽塞還向反望不見七通又以兩手承鹿盧倒懸令脚反在其上元愈頭眩風癲坐地舒兩脚以繩絆之以大繩絆訖拖鹿盧上來下去以兩手挽繩使脚上頭下不使離地自極十一通愈頭眩風癲久行身卧空中而不墜落

普濟方卷九十九